

# BUĞUSEPTİL® İnhalasyon İçin Buğu Çözeltisi

## KULLANIM KILAVUZU

### **BİRİM FORMÜLÜ**

48 ml çözeltide; 0,80 g mentol, 2,0 g ökaliptol, 0,80 g gomenol, 2,0 g terebentin esansı, 20,0 g benjuan tentürü ve alkol bulunur.

### **TIBBİ ÖZELLİKLERİ**

Mentol, hafif lokal anestezi, serinletici ve kötü kokuları maskeleyici; ökaliptol ve terebentin esansı, sekresyonları sulandırıcı ve konjesyonu giderici; benjuan tentürü ise lokal antiseptik, ekseptoran ve koruyucu özellikler gösterir.

### **ÖNERİLEN KULLANIM YERİ**

Soğuk algınlığı ve gripten ileri gelen nezle ve burun tıkanıklığı gibi durumlarda üst solunum yollarının rahatlatılması amacıyla kullanılır.

### **KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR**

- İçindeki maddelerden birine karşı aşırı hassasiyeti olduğu bilinenlerde kullanılmaz.
- Süt çocukları ve küçük çocuklarda mentole aşırı hassasiyet, glottis spazmı, asfiksi ve kollapsa sebep olabileceğinden kullanılmamalıdır.

### **UYARILAR/ÖNLEMLER**

*Kullanmadan önce Kullanım Kılavuzu'nu dikkatlice okuyunuz.*

*Kullanmakta olduğunuz ilaç var ise, muhakkak doktorunuza ve eczacınıza bildiriniz.*

- BUĞUSEPTİL®, sadece su buharı ile inhalasyon içindir; ağızdan alınmaz.
- İçeriğindeki alkol nedeniyle alev alabilir, ateşe yaklaştırmayınız.
- Eğer devamlı ve özellikle yüksek ateşle birlikte öksürük varsa, ciddi bir rahatsızlığınız olabileceğinden, doktora başvurmadan kullanmayınız.
- Gebelerde kullanımı: Ürünü kullanmadan önce doktora veya eczacıya danışınız. Ürün kullanılırken hamile kaldığınızı fark ederseniz hemen doktora veya eczacıya danışınız.
- Emzirenlerde kullanımı: Ürünü kullanmadan önce doktora veya eczacıya danışınız.
- BUĞUSEPTİL®'in araç veya makine kullanma becerisini etkilediğine dair bilgi yoktur.
- Kaza sonucu fazla miktarda içilirse bulantı, kusma, karın ağrısı, konvülsiyon, koma ve solunum yetmezliği oluşabilir. BUĞUSEPTİL®'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktora veya eczacıya danışınız.

### **YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER**

Mentol ve ökaliptolün yağlı merhem, sprey veya damla şeklinde tatbikinde görülebilen yan etkiler, inhalasyon şeklindeki uygulamalarda bildirilmemiştir.

*İstenmeyen bir etki görüldüğü zaman Sağlık Bakanlığı Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz.*

### **İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ ve DİĞER ETKİLEŞİMLER**

Bugüne kadar herhangi bir ilaç etkileşimi bildirilmemiştir.

**GÜNLÜK KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU**

Yarım litre su, devrilmesi güç bir kaptaki kaynatılarak bir masa üzerine alınır ve içine 1-2 kahve kaşığı BUĞUSEPTİL® konulduktan sonra buharı, ağız ve burundan 5 dakika kadar süreyle teneffüs edilir. Bu sırada başın bir örtü ile örtülmesi, buharın etrafa dağılmasını önleyeceğinden yararlı olur. Bu işlem, 2-3 saatte bir tekrarlanmalıdır.

Şayet burun delikleri tıkalı ise inhalasyondan önce temizlenmesi gereklidir. Tahrişi önlemek için gözler, inhalasyondan önce kapatılmalıdır.

(Not: Kullanılan kaptaki reçine, alkolle kolayca temizlenir.)

**TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ**

**BUĞUSEPTİL® İnhalasyon İçin Buğu Çözeltisi**; 48 ml çözelti içeren 50 ml'lik cam şişelerde.

**İZİN SAHİBİ ve ADRESİ**

SANTA FARMA İLAÇ SAN. A.Ş.  
34382 Şişli - İSTANBUL

**İZİN TARİHİ ve NUMARASI**

07.12.2009 - 2009/74

**ÜRETİCİ İSMİ ve ADRESİ**

SANTA FARMA İLAÇ SANAYİİ A.Ş.  
34091 Edirnekapı - İSTANBUL ve

FARMAMAG AMBALAJ SAN. ve TİC. A.Ş./İSTANBUL

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.  
25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

**BU ÜRÜNÜN TIBBİ YARARI GELENEKSEL KULLANIMA ve LİTERATÜRE DAYANMAKTADIR. TIBBİ MÜSTAHZAR (İLAÇ) OLARAK DEĞERLENDİRİLMEMİŞTİR.**

**SADECE ECZANELERDE SATILIR.**