

## KULLANMA TALİMATI

### SULFARHİN® burun merhemi Buruna uygulanır.

- **Etkin madde:** 1 g merhem; 8,3mg efedrin HCl, 8,3 mg kloreton, 2,5 mg antazolin HCl, 0,25 mg nafazolin HCl, 10,4 mg mentol, 10,4 mg ökaliptol içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Sodyum klorür, vazelin, (koyun yününden elde edilen) lanolin, deiyonize su.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **SULFARHİN® nedir ve ne için kullanılır?**
2. **SULFARHİN®'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **SULFARHİN® nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **SULFARHİN®'in saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. SULFARHİN® nedir ve ne için kullanılır?**

- SULFARHİN®, burun ve rinofarinkste (burun kanalının yutağa bağlandığı bölge) aşırı kanlanmayı azaltarak hastanın rahat nefes almasını sağlar. Burundaki kurutları yumuşatarak çıkışını kolaylaştırır. Hastayı rahatsız eden kaşıntı, ağrı ve gıcık hissini önler.
- SULFARHİN®, özel uçlu, 12 g'lık tüplerde sunulur. Homojen kıvamlı, cilde sürüldüğünde pütürsüz, sarı renkli, karakteristik kokulu merhemdir.
- SULFARHİN®, akut burun nezlesi, saman nezlesi, alerjik burun yangısı, irinli burun yangısı, sinüzit (çene, alın ve şakak kemikleri içinde bulunan ve buruna açılan, sinüs adı verilen içleri hava dolu boşlukların yangılanması) ve burnun mekanik tahrişlerine bağlı kurutlarda kullanılır.

SULFARHİN®, koyun yününden elde edilen lanolin içerir.

#### **2. SULFARHİN®'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

**SULFARHİN®'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer;

- Eğer SULFARHİN®'in herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlıysanız,
- Şiddetli hipertansiyon (kan basıncının yükselmesi) ve taşikardinin (kalp atım hızının artması) eşlik ettiği hastalıklarınız varsa,

- Koroner arter (kalbi besleyen damarlar) hastalığınız varsa,
- Siklopropan ve halotan ile anestezi almanız planlanıyorsa,
- Tirotoksikoz (tiroid bezinin aşırı çalışması) hastası iseniz.

Ayrıca, süt çocukları ve küçük çocuklarda mentole karşı aşırı hassasiyet, glottis (gırtlakta ses tellerinin bulunduğu kısım) spazmı ve kollapsa (solunum ve dolaşım yetmezliği) sebep olabileceğinden kullanılmamalıdır.

### **SULFARHİN®'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Eğer;

- Kalp atım düzensizliğiniz varsa,
- Şeker hastalığınız varsa,
- Hipertansiyonunuz varsa,
- Prostat hipertrofisiniz (prostat bezinin büyüyerek idrar yollarını sıkıştırması) varsa,
- Tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu (kalp atım ritminde bozukluk) veya Torsades de Pointes (bir tür kalp ritim bozukluğu) hastası iseniz, SULFARHİN® kullanımından kaçınınız.

Çok sık ve tavsiye edilenden fazla miktarda ve uzun süreli kullanmayınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

### **SULFARHİN®'in yiyecek ve içeceklerle kullanılması**

SULFARHİN®'in yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Hamilelerde kullanımına ilişkin klinik deneyim bulunmadığından SULFARHİN®, ancak doktorunuz muhtemel yarar beklentisinin, muhtemel risklerin üzerinde olduğuna inanıyorsa kullanılabilir.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Eğer emziriyorsanız SULFARHİN®'i kullanmayınız veya SULFARHİN® tedavisi alıyorsanız emzirmeyiniz.

### **Araç ve makine kullanımı**

SULFARHİN®'in araç veya makine kullanma becerinizi etkilediğine dair bilgi yoktur.

### **SULFARHİN®'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

SULFARHİN®'in içeriğinde bulunan koyun yününden elde edilen lanolin, lokal deri reaksiyonlarına (örneğin; kontak dermatite) neden olabilir.

### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

SULFARHİN®'i trisiklik antidepresan veya MAO inhibitörü ilaçlarla (depresyon tedavisinde kullanılır) birlikte kullanmaktan kaçınınız,

Sempatik sinir sistemini aktive eden diğerk ilaçlarla birlikte kullanıldığında ilave sempatik uyarı olabileceğini göz önünde bulundurunuz.

Bu ifadelerin belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### 3. SULFARHİN® nasıl kullanılır?

- **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:** Günde 2-3 defa burun deliklerine mercimek büyüklüğündeki miktarda sürülür. Genellikle 3-5 günlük tedavi süresi yeterlidir. Daha uzun süreli kullanılmamalıdır. Doktorunuz SULFARHİN® ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.
- **Uygulama yolu ve metodu:** Haricen burun deliklerine uygulanır.
- **Değişik yaş grupları**
  - **Çocuklarda kullanımı:** Süt çocukları ve küçük çocuklarda mentole karşı aşırı hassasiyet, glottis (gırtlakta ses tellerinin bulunduğu kısım) spazmı ve kollapsa (solunum ve dolaşım yetmezliği) sebep olabileceğinden kullanılmamalıdır.
  - **Yaşlılarda kullanımı:** Yaşlı hastalarda kullanımına ilişkin özel bir durum bulunmamaktadır.
- **Özel kullanım durumları:** Özel kullanım durumları bulunmamaktadır

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

*Eğer SULFARHİN®'in etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuza veya eczacınıza ile konuşunuz.*

### **Kullanmanız gerekenden daha fazla SULFARHİN® kullandıysanız**

*SULFARHİN®'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

### **SULFARHİN®'i kullanmayı unutursanız**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Unuttuğunuz dozu atlayınız, daha sonra normal alım saatine göre önerilen dozda yeniden almaya devam ediniz.*

### **SULFARHİN® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler**

Bilinmemektedir.

### 4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, SULFARHİN®'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

İstenmeyen etkilerin değerlendirilmesi aşağıdaki sıklık bilgilerine dayalıdır:

- Çok yaygın : 10 hastanın en az birinde görülebilir.
- Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
- Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

- Seyrek : 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
- Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
- Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:**

**Bilinmiyor:**

- Çok sık ve/veya uzun süreli kullanımlarda hızlı tolerans gelişimi (taşiflaksi),
- Aşırı hassasiyete bağlı kontakt dermatit (derinin bazı maddelerle teması sonucu oluşan bir reaksiyon)
- Burunda geçici kuruluk, karıncalanma ve yanma hissi
- Sinirlilik
- Bulanık görme
- İlacın daha yüksek dozda kullanılmasını gerektiren şiddetli burun tıkanıklığı, (Rebound konjesyon), kronik burun yangısı (kronik rinit)

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

**Yan etkilerin raporlanması**

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

**5. SULFARHİN®’in saklanması**

*SULFARHİN®’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.*

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Kutu üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden sonra SULFARHİN®’i kullanmayınız.*

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

**Ruhsat Sahibi:** Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.

Okmeydanı, Boruçiçeği Sokak, No: 16 34382 Şişli-İSTANBUL

Tel: (+90 212) 220 64 00

Fax: (+90 212) 222 58 89

**Üretim Yeri:** Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.

GEBKİM 41455 Dilovası - KOCAELİ

Tel: (+90 262) 674 23 00

Fax: (+90 262) 674 23 21

*Bu kullanma talimatı 25/07/2014 tarihinde onaylanmıştır.*