

BUĞUSEPTİL® İnhalasyon İçin Buğu Çözeltisi

KULLANIM KILAVUZU

BİRİM FORMÜLÜ

48 ml çözeltide; 0,80 g mentol, 2,0 g ökaliptol, 0,80 g gomenol, 2,0 g terebentin esansı, 20,0 g benjuan tentürü ve alkol bulunur.

TIBBİ ÖZELLİKLERİ

Mentol, hafif lokal anestezi, serinletici ve kötü kokuları maskeleyici; ökaliptol ve terebentin esansı, sekresyonları sulandırıcı ve konjesyonu giderici; benjuan tentürü ise lokal antiseptik, ekseptoran ve koruyucu özellikler gösterir.

ÖNERİLEN KULLANIM YERİ

Soğuk algınlığı ve gripten ileri gelen nezle ve burun tıkanıklığı gibi durumlarda üst solunum yollarının rahatlatılması amacıyla kullanılır.

KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR

- İçindeki maddelerden birine karşı aşırı hassasiyeti olduğu bilinenlerde kullanılmaz.
- Süt çocukları ve küçük çocuklarda mentole aşırı hassasiyet, glottis spazmı, asfiksi ve kollapsa sebep olabileceğinden kullanılmamalıdır.

UYARILAR/ÖNLEMLER

Kullanmadan önce Kullanım Kılavuzu'nu dikkatlice okuyunuz.

Kullanmakta olduğunuz ilaç var ise, muhakkak doktorunuza ve eczacınıza bildiriniz.

- BUĞUSEPTİL®, sadece su buharı ile inhalasyon içindir; ağızdan alınmaz.
- İçeriğindeki alkol nedeniyle alev alabilir, ateşe yaklaştırmayınız.
- Eğer devamlı ve özellikle yüksek ateşle birlikte öksürük varsa, ciddi bir rahatsızlığınız olabileceğinden, doktora başvurmadan kullanmayınız.
- Gebelerde kullanımı: Ürünü kullanmadan önce doktora veya eczacıya danışınız. Ürün kullanılırken hamile kaldığınızı fark ederseniz hemen doktora veya eczacıya danışınız.
- Emzirenlerde kullanımı: Ürünü kullanmadan önce doktora veya eczacıya danışınız.
- BUĞUSEPTİL®'in araç veya makine kullanma becerisini etkilediğine dair bilgi yoktur.
- Kaza sonucu fazla miktarda içilirse bulantı, kusma, karın ağrısı, konvülsiyon, koma ve solunum yetmezliği oluşabilir. BUĞUSEPTİL®'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktora veya eczacıya danışınız.

YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER

Mentol ve ökaliptolün yağlı merhem, sprey veya damla şeklinde tatbikinde görülebilen yan etkiler, inhalasyon şeklindeki uygulamalarda bildirilmemiştir.

İstenmeyen bir etki görüldüğü zaman Sağlık Bakanlığı Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ ve DİĞER ETKİLEŞİMLER

Bugüne kadar herhangi bir ilaç etkileşimi bildirilmemiştir.

GÜNLÜK KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU

Yarım litre su, devrilmesi güç bir kaptaki kaynatılarak bir masa üzerine alınır ve içine 1-2 kahve kaşığı BUĞUSEPTİL® konulduktan sonra buharı, ağız ve burundan 5 dakika kadar süreyle teneffüs edilir. Bu sırada başın bir örtü ile örtülmesi, buharın etrafa dağılmasını önleyeceğinden yararlı olur. Bu işlem, 2-3 saatte bir tekrarlanmalıdır.

Şayet burun delikleri tıkalı ise inhalasyondan önce temizlenmesi gereklidir. Tahrişi önlemek için gözler, inhalasyondan önce kapatılmalıdır.

(Not: Kullanılan kaptaki reçine, alkolle kolayca temizlenir.)

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

BUĞUSEPTİL® İnhalasyon İçin Buğu Çözeltisi; 48 ml çözelti içeren 50 ml'lik cam şişelerde.

İZİN SAHİBİ ve ADRESİ

SANTA FARMA İLAÇ SANAYİİ A.Ş.
34382 Şişli - İSTANBUL

İZİN TARİHİ ve NUMARASI

07.12.2009 - 2009/74

ÜRETİCİ İSMİ ve ADRESİ

Farmamag Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
Bağlariçi Caddesi No:14 34325 Avcılar - İstanbul
Tel: 0(212) 694 33 51 - 0(212) 695 11 21
Faks: 0(212) 694 62 94

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

BU ÜRÜNÜN TIBBİ YARARI GELENEKSEL KULLANIMA ve LİTERATÜRE DAYANMAKTADIR. TIBBİ MÜSTAHZAR (İLAÇ) OLARAK DEĞERLENDİRİLMEMİŞTİR.

SADECE ECZANELERDE SATILIR.