

KULLANMA TALİMATI

EUCARBON® tablet
Ağızdan alınır.

Bu tıbbi ürünü kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatı'nın tümünü dikkatlice okuyunuz.

- Bu kullanma talimatını muhafaza ediniz. Tekrar okumanız gerekebilir.
- Eğer başka sorularınız varsa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Bu kullanma talimatında:

1. EUCARBON® nedir ve ne için kullanılır
2. EUCARBON®'u kullanmaya başlamadan önce
3. EUCARBON® nasıl kullanılmalı
4. Olası yan etkileri
5. EUCARBON®'un saklanması
6. Diğer bilgiler

1. EUCARBON® NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR

EUCARBON®'un içeriğinde bulunan etkin maddeler sadece bitki ve mineral kökenlidir ve sindirim düzenleyici ve hafif laksatif (feçesi yumuşatarak atılmasını kolaylaştıran) etkiye sahiptir. Bitkisel kömür, sinameki (senne) yapraklarının ve ışgın (rubarb) ektresinin laksatif etkisiyle sonradan salgılanan çeşitli zararlı metabolik maddelerin etkisini azaltma yeteneğine sahiptir. Kükürt ayrıca sindirim sisteminde hafif bir dezenfektan etki de göstermektedir. EUCARBON®'un hafif laksatif etkisi uygulamadan 8-10 saat sonra ortaya çıkmaktadır. İrritabl barsak sendromu diye adlandırılan kabızlık, barsak ve karında rahatsızlık ile seyreden durumdan yakınan az sayıdaki hastada EUCARBON® olumlu sonuçlar göstermiştir.

EUCARBON®, 100 tablettten oluşan blister ambalajlarda sunulur. Tabletler, mat, grimsi siyah, hafif nane kokulu, hafif tatlı ve her iki tarafı bombeli tabletler şeklindedir

EUCARBON®, aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:

- Barsak geçişinin yavaşlaması,
- Barsak tıkanmasıyla seyreden durumlar hariç kabızlığın tüm formları,
- İnce barsaktaki parçalanma ve fermentasyon süreci,
- Meteorizm (karın ve barsaklarda gaz varlığı)
- Şişkinlik,
- İntestinal oto-intoksikasyon (barsaklarda kalan atıklara bağlı olarak görülen zehirlenme),
- Hemoroidal (basura bağlı olarak gelişen) kabızlık.

2. EUCARBON®'U KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE

EUCARBON®, un bebeklere, çocuklara ve yetişkinlere yönelik olduğuna dair bilgi

EUCARBON®, yetişkinler ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda kullanılır. 12 yaşın altında kullanılmamalıdır.

Aşağıdaki durumlarda EUCARBON®'u kullanmayınız;

- Eğer bitkisel kömür, sinameki (senne) yapraklarının ve ışgın (rubarb) ektresine veya EUCARBON®'un herhangi bir bileşenine aşırı duyarlıysanız (alerjik iseniz),
- Eğer barsak tıkanıklığınız varsa,
- Eğer akut yangılı barsak hastalığınız varsa,
- Eğer kökeni bilinmeyen karın ağrınız varsa,
- Eğer ciddi su ve elektrolit dengesi bozukluğunuz varsa,
- Eğer şüpheli mide veya barsak ülseriniz varsa,
- Apandisitte,
- Eğer hamilelikte ve süt verme döneminde iseniz.

Aşağıdaki durumlarda EUCARBON®'u özellikle dikkatle kullanınız:

- Güvenli bir etki elde edilmesi için gereken doz bireyler arasında değişkenlik gösterebilir.
- İshal ortaya çıkmasının bir doz aşımı belirtisi olduğunu göz önünde bulundurunuz.
- Doktorunuzun talimatı olmaksızın 1-2 haftadan daha uzun bir süre boyunca kullanmayınız.
- Zayıflatıcı bir ajan olarak kullanmayınız.
- 14 günden daha uzun süreli kesintisiz uygulama durumunda ilacın etkisi azalabilir.

EUCARBON®'un etkisine tesir edebilecek besinlerle ve içeceklerle kullanılması
EUCARBON® yemek sırasında veya yemekten sonra alınabilir.

Gebelik

Bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

EUCARBON®, hamilelik dönemi boyunca kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

Bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EUCARBON®, emzirme dönemi boyunca kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanma

EUCARBON®'un araç veya makine kullanma yeteneği üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

EUCARBON®'un bazı bileşenleri hakkında önemli bilgiler:

EUCARBON®'un içeriğinde uyarı gerektirecek herhangi bir bileşen bulunmamaktadır.

EUCARBON® ile birlikte diğer tıbbi ürünleri kullanmak

EUCARBON® kullanımına bağlı bir hipopotasemi (kanda potasyum seviyesi düşüklüğü) ortaya çıktığında, kalp glikozidlerinin etkisi artmaktadır.

EUCARBON®, barsaktan geçişi hızlandırdığından birlikte kullanılan ve barsaklardan emilen ilaçların emilimini azaltabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. EUCARBON® Nasıl Kullanılmalı

EUCARBON®'u kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza ve eczacınıza sorunuz.

Olağan doz;

Erişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklar için: Hafif bir laksatif ve purgatif (feçesin sulu kalmasını sağlayarak hızlı bir şekilde atılmasına neden olan) etki elde edilmesi için günde 3 defaya kadar 1-2 tablet kullanılır. Daha güçlü bir laksatif etki isteniyorsa akşam uygulanan doz 3-4 tablet EUCARBON® şeklinde artırılabilir. Günde 8 tablettten fazla alınmamalıdır.

Sindirim sistemindeki gazın eliminasyonu ve güçlü bir temizlenme için (örneğin; röntgen, ilaçlı böbrek filmi v.b. tetkiklerden önce): Akşam alınan 6-8 tablet EUCARBON®'dan sonra bol miktarda sıvı alınmalıdır.

Uzun dönemli, kesintisiz kullanımı sonucunda etkide bir azalma ortaya çıkabilir.

Doktorunuz EUCARBON® ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

Tabletler, yemek sırasında ya da yemekten sonra bol miktarda sıvı ile alınmalıdır.

Eğer EUCARBON®'un etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğu izlenimine sahipseniz doktorunuza ya da eczacınıza bildiriniz.

Eğer almanız gerekenden fazla EUCARBON® kullanırsanız:

Aşırı doz durumunda oluşabilecek başlıca belirti ishaldir. Bu durumda ilaç bırakılmalı veya dozaj azaltılmalıdır.

Eğer EUCARBON®'u kullanmayı unutursanız:

Unuttuğunuz dozu tamamlamak için çift doz almayınız.

EUCARBON® ile tedavi kesildiğinde görülen etkiler

Veri bulunmamaktadır.

4. Olası Yan Etkileri

Tüm ilaçlar gibi, EUCARBON®'un da yan etkileri olabilir.

- Aşağıdakilerden biri olursa EUCARBON®'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz, bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

- Deride yaygın kaşıntı ve döküntülerle beraber, dudakta, yüzde, boğazda ve dilde şişme, yutma veya nefes alma güçlüğü (aşırı duyarlılık-anafilaksi)

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin EUCARBON®'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

- Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz, Bunlar EUCARBON®'un hafif yan etkileridir.

- Önerilen dozda kullanıldığında yan etkiler çok nadirdir (karın ağrısı ve ishal görülebilir),
- Alkali reaksiyonda, zaman zaman idrarın soluk kırmızı bir renk aldığı gözlenebilir ve bu durum klinik açıdan anlamlı değildir,
- Çok seyrek olarak bulantı veya kusma görülebilir. Bu durum, doz aşımının bir belirtisi olabilir.

- Uzun bir süre boyunca yüksek dozlarda kullanıldığı zaman, başta potasyum olmak üzere, elektrolit kayıpları ortaya çıkabilir ve bu da barsak geçişindeki yavaşlamayı daha da artırabilir (barsak hareketlerinin kaybı ve kabızlık).

Eğer bu kullanma talimatında değinilmeyen herhangi bir yan etki fark ederseniz, lütfen doktorunuza ya da eczacınıza bildirin.

5. EUCARBON®'un Saklanması

EUCARBON®'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 30 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz EUCARBON®'u kullanmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra EUCARBON®'u kullanmayınız.

6. Diğer Bilgiler

Bu tıbbi ürün hakkında herhangi bir bilgi için, lütfen Ruhsat Sahibi ile temasa geçiniz.

EUCARBON® tablet, 100 tabletlik blister ambalajlarda sunulur.

- Etkin madde: Her tablette, 180 mg bitkisel kömür, 50 mg kükürt, 105 mg sinameki (senne) yaprağı tozu, 25 mg ışgın (rubarb) ekstresi bulunur.
- Diğer bileşenler: Kaolin, talk, gliserin, mısır nişastası, koloidal silikon dioksit, nane esansı ve rezene esansı.

Ruhsat Sahibi: F. Trenka - Chem.Pharm Fabrik Viyana lisansı ile
Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.
Okmeydanı, Boruçiçeği Sokak, No: 16 34382 Şişli-İSTANBUL
Tel: (+90 212) 220 64 00
Faks: (+90 212) 222 57 59
e-mail: www.santafarma.com

Üretim Yeri: Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.
Sofalıçeşme Sokak, No: 72-74 34091 Edirnekapı-İSTANBUL

7. Bu Kullanma Talimatının Son Onay Tarihi

Bu kullanma talimatı 14.01.2013'te onaylanmıştır.

SADECE ECZANELERDE SATILIR.